

Performance Erogati Aziendale - Gennaio 2020

ASL Salerno

| Prestazione | PRIORITA' U ENTRO 3 GG | | | | PRIORITA' B ENTRO 10 GG | | | | PRIORITA' D VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG | | | | PRIORITA' P ENTRO 120 GG 180 GG fino al 31 Dicembre 2019 | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|----------|----------------------------|-------|-----------------|----------|--|-------|----------|-----------------|--|-------|-----------------|----------|
| | Erog. | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog. | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog. | Disp. | Perform. | Giorni d'attesa | Erog. | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. |
| Prima visita Cardiologica | 21 | 1 | 17,1 | 57,1% | 64 | 7 | 14,2 | 68,8% | 100 | 16 | 21,5 | 74,0% | 1.531 | 265 | 30,4 | 98,8% |
| Prima visita Chirurgia vascolare | - | - | - | - | 4 | 0 | 5,0 | 100,0% | 2 | 1 | 11,5 | 100,0% | 74 | 11 | 13,0 | 100,0% |
| Prima visita Endocrinologica | 21 | 1 | 18,1 | 71,4% | 45 | 5 | 20,2 | 75,6% | 73 | 11 | 21,1 | 68,5% | 1.200 | 204 | 29,8 | 97,0% |
| Prima visita Neurologica | 12 | 0 | 4,4 | 91,7% | 41 | 5 | 16,2 | 58,5% | 77 | 17 | 34,7 | 33,8% | 1.075 | 256 | 36,5 | 96,8% |
| Prima visita Oculistica | 11 | 1 | 8,5 | 81,8% | 55 | 9 | 19,6 | 43,6% | 84 | 27 | 33,8 | 39,3% | 1.580 | 422 | 55,9 | 93,6% |
| Prima visita Ortopedica | 6 | 2 | 0,5 | 100,0% | 43 | 4 | 12,3 | 69,8% | 104 | 26 | 31,2 | 35,6% | 1.139 | 257 | 27,5 | 99,3% |
| Prima visita Ginecologica | 3 | 0 | 0,7 | 100,0% | 11 | 1 | 5,6 | 90,9% | 30 | 4 | 10,6 | 86,7% | 648 | 86 | 16,2 | 95,8% |
| Prima visita Otorinolaringoiatrica | 14 | 1 | 3,8 | 85,7% | 55 | 1 | 5,8 | 87,3% | 96 | 14 | 14,1 | 85,4% | 1.294 | 267 | 40,3 | 90,9% |
| Prima visita Urologica | 7 | 0 | 1,9 | 85,7% | 36 | 4 | 23,1 | 41,7% | 44 | 12 | 19,5 | 68,2% | 760 | 128 | 25,4 | 98,3% |
| Prima visita Dermatologica | 11 | 1 | 8,2 | 81,8% | 49 | 3 | 11,3 | 71,4% | 116 | 10 | 15,6 | 81,9% | 1.358 | 255 | 20,9 | 100,0% |
| Prima visita Fisiatrica | 16 | 2 | 6,8 | 81,2% | 75 | 6 | 12,5 | 81,3% | 183 | 18 | 16,8 | 72,7% | 2.576 | 298 | 26,0 | 97,7% |
| Prima visita Gastroenterologica | 6 | 0 | 9,0 | 66,7% | 12 | 2 | 4,6 | 100,0% | 20 | 2 | 8,8 | 90,0% | 210 | 37 | 17,1 | 99,5% |
| Prima visita Oncologica | 14 | 0 | 1,7 | 71,4% | 4 | 0 | 13,8 | 75,0% | 12 | 0 | 5,1 | 91,7% | 155 | 8 | 5,0 | 100,0% |
| Prima visita Pneumologica | 32 | 2 | 0,6 | 96,9% | 42 | 3 | 7,2 | 85,7% | 55 | 10 | 19,0 | 72,7% | 666 | 140 | 29,9 | 95,3% |
| Mammografia bilaterale | 2 | 0 | 0,0 | 100,0% | 2 | 0 | 30,5 | 50,0% | 5 | 0 | 40,0 | 40,0% | 122 | 34 | 53,3 | 98,4% |
| Mammografia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------|---|---|-----|--------|---|---|------|--------|----|----|------|--------|
| monolaterale | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| TC del Torace | - | - | - | | 2 | 1 | 0,0 | 100,0% | 5 | 1 | 6,6 | 100,0% | 73 | 7 | 6,6 | 100,0% |
| TC del Torace con MCD senza e con MCD | - | - | - | | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 5 | 0 | 0,0 | 100,0% | 70 | 1 | 0,0 | 100,0% |
| TC dell'addome superiore | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 1 | 1 | 0,0 | 100,0% |
| TC dell'addome superiore senza e con MDC | - | - | - | | - | - | - | | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 13 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| TC dell'Addome inferiore | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| TC dell'addome inferiore senza e con MDC | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 6 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| TC dell'addome completo | 1 | 0 | 1,0 | 100,0% | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 2 | 0 | 36,5 | 100,0% | 5 | 1 | 35,0 | 100,0% |
| TC dell'addome completo senza e con MDC | 1 | 1 | 0,0 | 100,0% | 2 | 0 | 0,0 | 100,0% | 5 | 0 | 0,0 | 100,0% | 76 | 1 | 0,0 | 100,0% |
| TC Cranio - Encefalo | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 3 | 0 | 7,0 | 100,0% | 51 | 17 | 17,6 | 100,0% |
| TC Cranio - Encefalo senza e con MDC | 1 | 2 | 11,0 | - | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 3 | 0 | 0,0 | 100,0% | 53 | 1 | 1,0 | 100,0% |
| TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | - | - | - | | - | - | - | | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 2 | 1 | 20,0 | 100,0% |
| TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | - | - | - | | - | - | - | | 1 | 0 | 13,0 | 100,0% | 4 | 2 | 36,8 | 100,0% |
| TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 11 | 3 | 11,0 | 100,0% |
| TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | |
| TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | |
| TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 5 | 0 | 1,6 | 100,0% |

| Descrizione prestazione | 1 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | - | - | - | ● | 2 | 0 | 30,0 | ● 100,0% | 19 | 3 | 14,5 | ● 100,0% |
|---|---|---|-----|-------------|----|---|------|-------------|----|---|------|-------------|-----|-----|------|-------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 1 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | - | - | - | ● | 2 | 0 | 30,0 | ● 100,0% | 19 | 3 | 14,5 | ● 100,0% |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | - | - | - | - | - | - | - | ● | 1 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | 22 | 3 | 16,5 | ● 95,5% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | - | - | - | - | 1 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | 1 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | 3 | 0 | 21,7 | ● 100,0% |
| RM della colonna in toto | 1 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | - | - | - | ● | 4 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | 59 | 4 | 12,6 | ● 100,0% |
| RM della colonna in toto senza e con MDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 94,0 | ● 100,0% |
| Diagnostica ecografica del capo e del collo | 1 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | 6 | 0 | 22,8 | ● 50,0% | 9 | 2 | 44,4 | ● 88,9% | 440 | 73 | 73,7 | ● 73,4% |
| Eco (color) dopplergrafia cardiaca | 4 | 0 | 0,5 | ● 100,0% | 8 | 2 | 0,4 | ● 100,0% | 13 | 0 | 21,9 | ● 76,9% | 388 | 63 | 50,2 | ● 97,4% |
| Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraortici | 2 | 0 | 1,5 | ● 100,0% | 13 | 2 | 23,8 | ● 46,2% | 19 | 1 | 14,3 | ● 100,0% | 589 | 87 | 35,5 | ● 98,8% |
| Ecografia dell'addome superiore | - | - | - | - | 1 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | 5 | 1 | 62,8 | ● 80,0% | 49 | 8 | 32,6 | ● 98,0% |
| Ecografia dell'addome inferiore | - | - | - | - | 2 | 0 | 14,0 | - | 4 | 1 | 21,5 | ● 100,0% | 133 | 25 | 36,3 | ● 95,5% |
| Ecografia dell'addome completo | 8 | 0 | 4,8 | ● 50,0% | 5 | 3 | 14,4 | ● 60,0% | 21 | 7 | 19,2 | ● 100,0% | 339 | 105 | 28,6 | ● 99,1% |
| Ecografia bilaterale della mammella | 1 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | 2 | 1 | 25,0 | ● 50,0% | 7 | 2 | 6,1 | ● 100,0% | 254 | 54 | 70,5 | ● 71,3% |
| Ecografia monolaterale della mammella | - | - | - | - | 2 | 0 | 10,0 | ● 100,0% | - | - | - | - | 5 | 0 | 29,4 | ● 100,0% |
| Ecografia ostetrica | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | ● 100,0% | 4 | 0 | 0,0 | ● 100,0% | 82 | 9 | 6,5 | ● 100,0% |
| Ecografia ginecologica | 3 | 0 | 0,7 | ● 100,0% | 3 | 0 | 3,0 | ● 100,0% | 11 | 0 | 11,4 | ● 100,0% | 227 | 27 | 14,5 | ● 96,5% |
| Ecocolordoppler degli arti | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|--------|----|---|------|--------|-----|----|------|--------|-------|-----|------|--------|
| inferiori arterioso e/o venoso | 4 | 3 | 1,8 | 100,0% | 10 | 5 | 18,3 | 60,0% | 17 | 4 | 20,6 | 88,2% | 450 | 50 | 22,5 | 100,0% |
| Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 45 | 0 | 0,2 | 100,0% | 41 | 0 | 2,5 | 95,1% | 19 | 4 | 25,1 | 94,7% | 412 | 60 | 38,0 | 95,1% |
| Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 27 | 0 | 1,3 | 100,0% |
| Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 3 | 1 | 0,0 | 100,0% |
| Esofagogastroduodenoscopio | 27 | 0 | 0,0 | 100,0% | 23 | 1 | 3,1 | 95,7% | 19 | 2 | 30,9 | 94,7% | 240 | 55 | 31,2 | 99,6% |
| Esofagogastroduodenoscopio con biopsia in sede unica | 11 | 0 | 0,3 | 100,0% | 22 | 0 | 0,0 | 100,0% | 17 | 1 | 22,4 | 100,0% | 208 | 25 | 28,2 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | 29 | 1 | 13,0 | 65,5% | 76 | 8 | 16,2 | 68,4% | 130 | 18 | 23,2 | 88,5% | 2.607 | 377 | 30,4 | 98,5% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% | 2 | 0 | 0,5 | 100,0% | 5 | 0 | 8,6 | 100,0% | 129 | 23 | 39,5 | 98,4% |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile | - | - | - | - | 2 | 0 | 4,5 | 100,0% | 2 | 0 | 7,5 | 100,0% | 52 | 8 | 40,5 | 96,2% |
| Altri test cardiovascolari da sforzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esame audiometrico tonale | 4 | 0 | 8,2 | 75,0% | 11 | 0 | 19,1 | 72,7% | 25 | 6 | 16,8 | 96,0% | 658 | 136 | 65,7 | 82,1% |
| Spirometria semplice | 7 | 1 | 1,7 | 85,7% | 12 | 1 | 11,7 | 75,0% | 35 | 7 | 21,0 | 97,1% | 477 | 114 | 45,1 | 92,7% |
| Spirometria globale | 4 | 0 | 0,0 | 100,0% | 6 | 0 | 21,3 | 66,7% | 14 | 1 | 28,6 | 85,7% | 137 | 48 | 88,9 | 62,0% |
| Fotografia del fundus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| Elettromiografia Semplice [EMG] per arto superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. | 2 | 0 | 1,0 | 100,0% | 4 | 0 | 13,0 | 50,0% | 10 | 0 | 29,2 | 100,0% | 56 | 12 | 26,4 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa | 4 | 0 | 4,0 | 50,0% | 8 | 0 | 8,0 | 75,0% | 2 | 0 | 29,0 | 100,0% | 26 | 5 | 33,8 | 100,0% |